

Um die Ergebnisse der Spermioogramms möglichst nicht zu verfälschen, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten: Die Samenprobe zur Untersuchung der Fruchtbarkeit sollte durch Masturbation (Selbstbefriedigung) nach 2 bis 5 Tagen ohne Samenerguß erfolgen.

Sie sollten vor der Gewinnung der Probe den Genitalbereich und insbesondere die Eichel mit einer milden Seife waschen und die Blase entleert haben.

Es dürfen keine Kondome oder Gleitmittel benutzt werden, da diese negativen Einfluß auf die Qualität der Probe haben können.

Die Probe sollte Körperwarm innerhalb einer Stunde in der Praxis nach vorheriger Terminvereinbarung abgegeben werden.

Geben Sie uns bitte bei der Abgabe des Samenprobe dieses Informationsblatt mit ab, nachdem Sie die folgenden Information ausgefüllt haben:

Tage seitdem letzten Samenerguß:       2    3    4    5  
Uhrzeit der Probengewinnung:      \_\_\_\_\_ Uhr  
Ist die gesamte Probe in dem Gefäß?       ja    nein

Termin zur Abgabe der Probe:

Als Probenbehälter eignet sich ein in der Apotheke erhältlichlicher, verschließbarer Urinprobenbecher